

Reviewed article

Valoski J, Rodrigues AOJ, Paula ICSF, Wernek RI, Orsi JSR. Prevalence of domestic violence and associated factors among pregnant women using the Brazilian Unified Health System: a cross-sectional study, Curitiba, 2018-2020. Epidemiol Serv Saude. 2026;35:e20250920.

doi

doi • 10.1590/S2237-96222026v35e20250920.en

Peer review A

Cristina Pissetti  Universidade Federal da Paraíba, Obstetrícia e Ginecologia, João Pessoa, PB, Brazil

Date review returned: 13-set.-2025

Questionnaire	Yes	No	Not applicable
Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?	☒		
Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?	☒		
Is the problem significant and concisely stated?	☒		
Are the methods described comprehensively?	☒		
Are the interpretations and conclusions justified by the results?	☒		
Is adequate reference made to other work in the field?	☒		

Manuscript Structure:

Length of article is:	Adequate
Number of tables is:	Adequate
Number of figures is:	Adequate

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper: None

Rating	Excellent	Good	Average	Below Average	Below Poor
Interest		☒			
Quality		☒			
Originality	☒				
Overall		☒			

Recommendation:

Accept Major Revision ☒
 Minor Revision Reject

Comments

Pontos Fortes:

O tema é relevante, com potencial de impacto em políticas de saúde.

Foram utilizados dados primários, padronizados e coletados por equipe treinada.

Foi realizada a aplicação de modelo multivariado adequado (RP com IC95%), controlando confundimento.

A discussão é embasada em literatura nacional e internacional.

O manuscrito segue recomendações STROBE.

1. Comentários críticos

1.1. Em relação aos métodos:

Amostra e representatividade:

Recomenda-se detalhamento do impacto da exclusão das 50 gestantes que não responderam à pergunta de violência. Considere comparar características básicas das participantes incluídas vs. excluídas, para avaliar possível viés de seleção. A fim de minimizar o viés de informação, recomenda-se que se explicita se a coleta da informação sobre violência foi feita em ambiente reservado e por entrevistadoras treinadas para reduzir subnotificação. Explique como a validade interna foi garantida.

1.2. Tabelas

As tabelas não apresentam o total de 194 participantes. Recomenda-se a revisão ou justificativa de não ter as 194 incluídas no estudo. Consta o valor do Qui-quadrado, mas na verdade é o valor de p. Quando com significância estatística, não mostra entre quais variáveis há a diferença. Sugere-se considerar um pós teste.

2. Comentários importantes

2.1. Explique como os resultados podem ser generalizados e aplicados em outros contextos, justificando a relevância do estudo para diferentes populações. Discuta a validade externa do estudo.

2.2. Acrescente informações sobre a validação e confiabilidade do instrumento de coleta de dados, discutindo as falhas decorrentes da não validação, se aplicável.

2.3. Na discussão (linhas 28 e 29), os autores referenciam o impacto da violência psicológica na autoestima da mulher e fazem uma ligação/associação com o sentimento de tristeza observado na amostra. Afirmam que a baixa autoestima pode ser constatada pelo sentimento de tristeza, mas não há necessariamente uma relação e nem a análise dos dados permite tal inferência. Seria importante caracterizar melhor o que foi considerado gestação de riscos alto, intermediário e habitual para entender melhor a associação entre a violência e a gestação de risco intermediário. Recomenda-se a discussão da não estratificação dos níveis de violência e do tempo que a mulher a sofre. Podem ser informações importantes para os achados do estudo.